



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Blackstonia

Redacció i composició

Daniel Pérez Bosque

Josep Pallarès Batriu


Maquetació web

Josep Pallarès Batriu



B. perfoliata comprèn 5 subespècies:

a1. Fulles caulinars connates, gens o poc atenuades a la part basal (a cada parell, la zona d'unió de les dues fulles te quasi l'amplada màxima de la fulla) [a]; segments del calze linears, normalment 1-nervats [b] **b**



a2. Fulles caulinars atenuades a la base (a cada parell, apareix una constricció que correspon a la zona basal de les dues fulles) [a]; segments del calze linear-lanceolats o lanceolats, sovint trinervats [b] **c**



b1. Anteres generalment més llargues que la part lliure del filament [a]; corol·la (7)8-12(16) mm [b]; fulles inferiors (8)15-35(50) × 4-20(27) mm [c]

.... *B. perfoliata* subsp. *perfoliata*



b2. Anteres més curtes que la part lliure del filament [a]; corol·la (6)7-10(12) mm [b]; fulles inferiors 4-10(17) × 2-5(12) mm [c] *B. perfoliata* subsp. *intermedia*



c1. Segments del calze 2 vegades mes llargs que el tub, trinervats [a]; fulles superiors lliures o poc connates [b] [B. perfoliata subsp. imperfoliata](#)

c2. Segments del calze 3-4 vegades mes llargs que el tub [a]; fulles superiors netament connates [b]; planta petita i gràcil [c] [d](#)



d1. Anteres més llargues o de la mateixa longitud que la part lliure del filament [a]; corol·la 9-14 (17) mm [b];

fulles inferiors 6-15(20) × (3)4-9(12) mm [c] [B. perfoliata](#) subsp. [acuminata](#)

(*Blackstonia acuminata* subsp. *acuminata*)

d2. Anteres més curtes que la part lliure del filament [a]; corol·la 7-11,5 mm [b]; fulles inferiors 4-8(15) × 3-8 mm [c]

..... [B. perfoliata](#) subsp. [aestiva](#)

(*Blackstonia acuminata* subsp. *aestiva*)